



HiHealth®

Starting Health

Daroo Salamat Pharmed Co.



# Felip® Fort

## Liposomal Iron Drops

- Enhanced absorption
- Well tolerated
- No metal taste
- No teeth coloring effect



|  (+98) 21 88192740-43  
 [www.daroosf.com](http://www.daroosf.com)  
 [@hi.health\\_co](https://www.instagram.com/hi.health_co)

# Felip® Fort

Liposomal Iron Drops



طبق تجویز پژوهش مصرف شود.  
محتویات سашه را به طور کامل به بطری درون  
جعبه اضافه کنید، درب بطری را ببندید و به خوبی  
تکان دهید تا محلولی یکدست بدست بیاید. قبل از هر  
بار مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.  
**شرایط نگهداری:**

پس از آماده سازی و افزودن محتویات ساشه به بطری به  
مدت ۴ هفته در دمای ۸-۲ درجه سانتی گراد (داخل یخچال)  
قابل نگهداری می باشد.

## SUPPLEMENT FACTS

Serving size: 1 mL	%RDA
Serving per container: 30 mL	
Iron (as ferric pyrophosphate) 15 mg	
214	
<b>Other ingredients:</b> Xanthan gum, Sucrose, Milk flavor, Potassium sorbate, Sodium benzoate, Purified water	

## References:

1. Prevention of iron deficiency anemia in infants and toddlers. Sripriya Sundararajan & Heike Rabe. 24 April 2020
2. Diagnosis and Prevention of Iron Deficiency and Iron-Deficiency Anemia in Infants and Young Children (0–3 Years of Age) FROM THE AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS| CLINICAL REPORT| NOVEMBER 01 2010. Robert D. Baker, MD, PhD; Frank R. Greer, MD; The Committee on Nutrition



ارتباط با مشتری (CRM) : ۰۲۱ - ۰۲۶۴۱۲۷۱۱  
وب سایت: [www.daroosf.com](http://www.daroosf.com)

آهن یکی از ضروری ترین مواد معدنی مورد نیاز بدن است که برای رشد جسمی، تکامل ذهنی، متابولسیم سلولی و ساخت برخی از هormون ها ضروری است. کمبود آهن در دوران نوزادی و کودکی می تواند باعث بروز عوارض جسمی و ذهنی گاهاً جبران ناپذیری شود. فقر آهن یکی از شایع ترین دلایل کم خونی در کودکان است. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت ۲۷۳ میلیون کودک زیر پنجم سال دچار کم خونی هستند که ۵۰ درصد آنها به دلیل فقر آهن است.<sup>۱</sup>

کم خونی با ایجاد سوء تغذیه و افزایش احتمال ابتلا به عفونت، مرگ و میر را در کودکان افزایش می دهد. همچنین مطالعات انجام شده نشان می دهد فقر آهن سبب بروز مشکلات شناختی و رفتاری در کودکان می شود.<sup>۲</sup>

قطره فلیپ<sup>®</sup> فورت دارای ۱۵ میلی گرم آهن لیپوزومال (فریک پیروفسفات) می باشد. این قطره نیاز کودکانی را که در معرض کم خونی ناشی از فقر آهن می باشند و یا در جذب کافی آهن دچار مشکل هستند، فراهم می کند. قطره فلیپ<sup>®</sup> فورت به دلیل لیپوزومال بودن، عوارض شایع مصرف مکمل های آهن مانند دل درد، عوارض گوارشی تهوع و بیوست، طعم فلزی ناشی از آهن، سیاه شدن دندان ها را ندارد. هم چنین به طور معمول توصیه می شود به دلیل تداخل در جذب با سایر مواد معدنی و برخی مواد غذایی، آهن با فاصله از این ترکیبات و ترجیحاً با معده خالی مصرف شود اما قطره فلیپ<sup>®</sup> فورت با فرمولا سیون لیپوزومال فراهمی زیستی بالایی دارد و به راحتی قابل جذب بوده و می تواند همراه غذا یا شیر مصرف شود.

## مقدار و نحوه مصرف:

در کودکان بالای ۶ ماه روزانه یک میلی لیتر (معادل ۱۵ میلی گرم آهن لیپوزومال) و یا